




Дугорепа сова (*Strix uralensis*)



**Статус:** гнездарица очуваних шумских комплекса неколико брдских и планинских масива чија се популација процењује на 430-650 гнездедићих парова.

**Распрострањење:** североисточна Европа, на Карпатима, шумовите планине Балканског полуострва, већи део умереног појаса Азије до обала Тихог океана.

**Распрострањење у Србији:** регистрована је од Вршачког брега преко Ђердана до планинских венаца у централној, југозападној, источnoј и југоисточној Србији (Гоч, Жељин, Копаоник, Тара, Јадовник, Златар-Увац, Голија, Кучај-Бељаница, Стара планина, Сува планина).

**Станишта:** густе и добро очуване четинарске и планинске мешовите и листопадне шуме.

**Гнежђење:** у старим или преотетим гнездима птица грабљивица и у шупљим стаблима дрвећа.

**Исхрана:** храни се ситним сисарима (волухарице, мишеви, пухови), а лови и мање птице (укључујући и друге врсте сова) и крупне инсекте.

**Фактори угрожавања:** нестајање стarih и очуваних шумских састојина




Фото - Арбиње, Марија Катић



Аутори слика:  
Милош Радаковић,  
Драженко Рајковић,  
Марија Катић,  
Братислав Грубач

Аутор илустрација:  
mr Растко Јајтић

Аутори текста:  
Милош Радаковић,  
Драгана Недељковић

Стара планина се мањим делом протеже у источној Србији, а другим, већим делом, у суседној Бугарској. Ово подручје је изузетно вредно са становишта биљног и животињског света и њихових заједница, као и са геоморфолошког, геолошког, хидролошког и хидрогеолошког аспекта. Уредбом Владе РС, део подручја Старе планине у Србији проглашен је 1997. године за Парк природе.

На подручју Старе планине евидентирано је 213 врста птица. Фамилијом Strigidae и Tytonidae обухваћене су сове, врсте које су због необичног изгледа и понашања привлачиле пажњу људи од давнина. Њихов ноћни начин живота, "човеколики" излед и оглашавање, које у ноћној тишини може да буде застрашујуће, представља значајне факторе због којих људи имају предрасуде према овим птицама. Сове су претежно ноћне грабљивице. Поједине врсте су активне у сумрак, а када је време исхране младих могу бити активне и преко дана. Специфичне особине сова у односу на друге птице су положај очију (налазе се у једној равни), бешуман лет (који им несумњиво даје предност при ноћном лову) и добро развијен слух. На подручју Старе планине евидентирано је шест врста сова - дугорепа сова (*Strix uralensis*), шумска сова (*Strix aluco*), утина (*Asio otus*), буљина (*Bubo bubo*), тук (*Otus scops*) и кукумавка (*Athene noctua*), док се Пројектом „Мониторинг птица Старе планине“ интензивно трага за врстом гаћаста кукумавка (*Aegolius funereus*) која захтева одређени тип станишта (виша подручја у појасу добро очуваних смрчевих и мешовитих шума).

#### ЛЕГЕНДА:

**C** – (статус врсте на подручју Старе планине): b - гнездарица, pb - могућа/вероватна гнездарица, r - присутна током целе године, р - пролазница на сеоби;

**C3** – (статус заштите у Србији): строго заштићена врста према Правилнику о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива ("Службени гласник РС", бр. 5/2010 и 47/2011).

**Bern** – Конвенција о очувању европске дивље флоре и фауне и природних станишта (II - додатак строго заштићене животињске врсте);

**ДП** - Директива о заштити дивљих птица Европске уније (I - додатак строго заштићене врсте).

Пројекат „Мониторинг птица Старе планине“ реализује Завод за заштиту природе Србије у сарадњи са управљачем Парка природе „Стара планина“ - ЈП „Србијашуме“. Пројекат је финансијски подржан од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине.



# СОВЕ ПАРКА ПРИРОДЕ СТАРА ПЛАНИНА



INSTITUTE  
FOR NATURE  
CONSERVATION  
OF SERBIA  
ЗАВОД ЗА  
ЗАШТИТУ  
ПРИРОДЕ  
СРБИЈЕ



**Статус:** станарица са процењених 240-340 гнездећих парова у Србији.

Гаћаста кукумавка (*Aegolius funereus*)

**Распрострањење:** шире подручје умереног појаса Азије, већи део Скандинавског полуострва и североисточне Европе, као и четинарске шуме централне Европе, Пиринеја, планина Балканског полуострва и Кавказа.

**Распрострањење у Србији:** најбројнија је на подручју Копаоника, а затим на Тари, Златару-Увцу, Голији, Мојстирско-Драшким планинама, а малобројна на Жељину. Потенцијална станишта су и на Старој планини, уз српско-бугарску границу (Арбиње, Копрен, делови западно и северозападно од Миџора).

**Станишта:** различити типови четинарских шума, од равница до високих планина.

**Гнежђење:** гнезди се у дупљама дрвећа, често у направљеним од стране црне жуне.

**Исхрана:** храни се претежно волухарицама и другим ситним сисарима, као и малим птицама.

**Фактори угрожавања:** фрагментација станишта, сеча шуме, а нарочито старих стабала са дупљама, узнемирање током периода гнежђења.



**Статус:** станарица у Србији, северне популације преко зиме силазе јужније.

Утина (*Asio otus*)

**Распрострањење:** већи део Европе, северне и централне Азије, Близког Истока, Мале Азије и у северној Америци.

**Распрострањење у Србији:** широм Србије. У Војводини се налази половина популације а рас прострањено је до високих планина у Србији.

**Станишта:** мозаична станишта са отвореним површинама на којима лови и дрвећем на коме се гнезди. Редовна је на пољопривредним подручјима, као и у градским и сеоским насељима.

**Гнежђење:** користи напуштене гнезда крупнијих птица, најчешће представника породице врана (сврака, сива врана и гачац). Одликује је групно зимовање, често у градовима и селима. У Србији се гнезди 19000-28000 парова.

**Исхрана:** углавном лови ситне сисаре (пре свега волухарице и мишеве), мање птице и крупне инсекте.

**Фактори угрожавања:** убијање и прогањање услед сујеверја, индиректно тројевање, уништавање станишта.



**Статус:** једина права селица међу совама у Србији.

Ћук (*Otus scops*)

**Распрострањење у Србији:** у Србији је редовна гнездарица чија је популација процењена на 27500-43500 гнездећих парова. Већина популације се гнезди у побрђу и долинама јужно од Саве и Дунава, док се у Војводини ареал шири и бројност расте.

**Станишта:** различита мозаична станишта на којима су заступљени отворени терени и шумарцима, живицама, маслињацима, шумама око река, старим воћњацима, дрворедима, парковима и вртовима у медитеранским, субмедитеранским и степским пределима, најчешће у равницама и побрђу.

**Гнежђење:** гнезди се у дупљама у дрвећу, ређе у шупљинама у стенама или грађевинама, а врло радо прихвате вештачке дупље.

**Исхрана:** храни се претежно крупним инсектима (зрикавци, тврдокрилци, ноћни лептири), а повремено лови мале сисаре, птице, гмизавце и водоземце.

**Фактори угрожавања:** губитак природних места за гнежђење, нарушање станишта, узнемирање и прогањање у време гнежђења.



**Статус:** станарица са процењених 14500-21000 гнездећих парова у Србији.

Кукумавка (*Athene noctua*)

**Распрострањење у Србији:** широко распространена врста која углавном прати насеља од највиших делова Војводине до брдско-планинских подручја јужно од Саве и Дунава.

**Станишта:** разноврсна отворена и мозаична станишта, укључујући пољопривредна подручја и рурална насеља.

**Гнежђење:** гнезди се у дупљама дрвећа, људским објектима (тавани, пукотине у зидовима и крововима), рупама у лесним одсекцима, земљи и стенама. Углавном је станарица, мада су забележена лутања на дуже стазе.

**Исхрана:** храни се инсектима, глистама, ситним сисарима, птицама, водоземцима и гмизавцима. Активна је ноћу, повремено и током дана.

**Фактори угрожавања:** прогањање и убијање услед сујеверја, губитак места за гнежђење, нарушање станишта и узнемирање у периоду гнежђења.



**Статус:** станарица са процењених 370-520 гнездећих парова у Србији.

Буљина (*Bubo bubo*)

**Распрострањење:** већи део Европе, осим дела Скандинавског полуострва и Ирске, као и умерени и централни делови Азије (до Кореје на истоку, Ирана и Хималаја на југу) и делу северне Африке.

**Распрострањење у Србији:** широм Србије, највише у брдско-планинском појасу.

**Станишта:** шуме (углавном листопадне и мешовите са састионије), мозаични предели са забранима и шумарцима, паркови и запуштени вртови.

**Гнежђење:** јаја полаже у дупљама дрвећа, ређе на људским грађевинама, а приhvата и кутије за гнежђење.

**Исхрана:** храни се ситним сисарима (волухарице, мишеви, ровчице), малим птицама, ређе водоземцима, крупним инсектима и другим бескичмењацима.

**Фактори угрожавања:** сеча шуме, а нарочито старих стабала са дупљама, фрагментација станишта, прогањање и убијање.

**Распрострањење:** већи део Европе (осим равничарских делова централне и западне Европе и делова Скандинавског полуострва), у малој Азији, на Близком Истоку и у врло широком подручју умерене и централне Азије до обала Тихог океана.

**Распрострањење у Србији:** у Србији је рас прострањена углавном јужно од Саве и Дунава, у клисурама и кањонима, брдско-планинским подручјима.

**Станишта:** различита станишта која пружају могућности за гнежђење и исхрану- клисуре, кањони, планинска подручја, степе и полупустине, шуме и морске обале.

**Гнежђење:** у заклонима у стенама, на тлу, повремено на рушевинама старих грађевина и лесним одсекцима.

**Исхрана:** врло разноврсна и састоји се претежно од сисара и птица (у Европи су најзаступљенији глодари, јежеви, зечеви, вране, водене птице, мале и средње птице грабљивице, друге врсте сова).

**Фактори угрожавања:** убијање, прогањање, нестајање станишта.